

Hojaji ya Uchunguzi wa Kabla ya Kujisajili

#	Swali la Uchunguzi	Hatua ya Kuchukuliwa
1.	<p>Je, umekuwa na <u>athari kali ya kutishia maisha ya mzio*</u> (kama anaphylaxis) kwa dozi ya hapo awali ya chanjo ya COVID-19 ya Pfizer-BioNTech, au viambato vyovoyote vya chanjo (ikiwemo polyethylene glycol)?</p> <p>AU</p> <p>Je, umewahi kuwa na <u>athari ya mzio ya ukali wowote</u> ndani ya saa 4 baada ya kupokea dozi ya hapo awali ya chanjo ya COVID-19 ya Pfizer-BioNTech au viambato vyovoyote vya chanjo (ikiwemo polyethylene glycol)?</p> <p>Viambato vya Chanjo ya Pfizer-BioNTech vinajumuisha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Messenger RNA (mRNA) • Lipidi: <ul style="list-style-type: none"> ○ (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) ○ 2[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide ○ 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ○ Cholesterol • Potasamu kloraidi • Monobasic potasamu fosfeti • Sodiamu kloraidi • Dibasic sodiamu fosfeti haidreti • Sukrosi 	
	<p>➤ NDIYO</p> <p>➤ HAPANA</p>	USIPEANE chanjo ya Pfizer-BioNTech au Moderna. Nenda kwa Swali #2
2.	<p>Je, umekuwa na <u>athari kali ya kutishia maisha ya mzio*</u> (kama anaphylaxis) kwa dozi ya hapo awali ya chanjo ya COVID-19 ya Moderna, au viambato vyovoyote vya chanjo (ikiwemo polyethylene glycol)?</p> <p>AU</p> <p>Je, umewahi kuwa na <u>athari ya mzio ya ukali wowote</u> ndani ya saa 4 baada ya kupokea dozi ya hapo awali ya chanjo ya COVID-19 ya Moderna au viambato vyovoyote vya chanjo (ikiwemo polyethylene glycol)?</p> <p>Viambato vya Chanjo ya Moderna vinajumuisha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Messenger RNA (mRNA) • Lipidi: <ul style="list-style-type: none"> ○ SM-102 (inahusiana na Moderna) ○ Polyethylene glycol [PEG] 2000 dimyristoyl glycerol [DMG] ○ 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC] ○ Cholesterol • Tromethamini • Tromethamini haidrokloridi • Asidi ya asetiki • Sodiamu asetati • Sukrosi 	
	<p>➤ NDIYO</p> <p>➤ HAPANA</p>	USIPEANE chanjo ya Pfizer-BioNTech au Moderna. Nenda kwa Swali #3
3.	<p>Je, umewahi kuwa na <u>athari ya mzio ya ukali wowote</u> ndani ya saa 4 baada ya kupokea polysorbate? (<i>Kumbuka: polysorbate ina muundo sawa na polyethylene glycol, ambayo ni kiambato katika chanjo za COVID-19 za Pfizer- BioNTech na Moderna mRNA. Kwa hivyo mtu aliye na mzio wa polysorbate anaweza kuwa katika hatari kubwa zaidi ya kuwa na athari ya mzio kwa mojawapo ya chanjo hizi za COVID-19.</i>)</p>	
	<p>➤ NDIYO</p> <p>➤ HAPANA</p>	USIPEANE chanjo ya Pfizer-BioNTech au Moderna. Nenda kwa Swali #4
4.	<p>Je, umekuwa na <u>athari kali ya kutishia maisha ya mzio*</u> (kama anaphylaxis) kwa chochote (ikiwemo</p>	

	dawa nyingine, chakula, vitu, hatari za kimazingira, nk.)?	
	<u>AU</u> Je, umewahi kuwa na <u>athari ya mzio ya ukali wowote ndani ya saa 4 baada ya kupokea chanjo</u> nyingine au dawa inayoweza kudungwa sindano (<u>ikiwemo sindano za dawa kwenye mshipa, misuli, au chini ya ngozi</u>)?	
	➤ NDIYO	Mtu anaweza kuratibu kupewa chanjo, lakini pendekeza mtu huyo ajadili kwanza historia yake ya mzio, na hatari na faida za chanjo na mtoa huduma wake wa msingi. Mpe “ <i>Taarifa kuhusu Chanjo ya COVID-19 kwa Watu walio na Hali Fulani za Kiafya</i> ”. Atakapopewa chanjo, atachunguzwa kwa dakika 30 baada ya chanjo.
	➤ HAPANA	Nenda kwa Swali #5
5.	Je, umepokea tiba ya kingamwili ya kutibu COVID-19 ndani ya siku 90 zilizopita (hi iinajumuisha convalescent plasma na kingamwili za monoclonal, kama bamlanivimab na casirivimab/imdevimab)? (<i>Kumbuka: Chanjo za COVID-19 hazipaswi kupeanwa kwa angalau siku 90 baada ya mtu kupokea tiba ya kingamwili kutibu COVID-19 ili kuzuia uwezekano wa tiba ya kingamwili kuingiliana na chanjo.</i>)	
	➤ NDIYO	USIRATIBU chanjo hadi siku 90 ziwe zimepita tangu kupokea tiba ya kingamwili.
	➤ HAPANA	Nenda kwa Swali #6
6.	Je, umepokea chanjo nyingine isiyohusiana (k.m., mafua) katika siku 14 zilizopita? (<i>Kumbuka: Chanjo ya COVID-19 inapaswa kupeanwa peke yake na angalau siku 14 tofauti na chanjo nyingine.</i>) ➤ Ikiwa Ndiyo, ni lini tarehe ya chanjo yako ya mwisho ya chanjo nyingine? (Weka Tarehe)	
	➤ NDIYO	USIRATIBU chanjo hadi siku 14 ziwe zimepita tangu kupokea chanjo nyingine).
	➤ HAPANA	Nenda kwa Swali #7
7.	Je, una kinga ya mwili iliyoathirika sana** (kinga yako imedhoofika na haifanyi kazi vizuri)?	
	➤ NDIYO	Mtu anaweza kuratibu kupewa chanjo, lakini pendekeza mtu huyo ajadili kwanza hali ya kinga, na hatari na faida za chanjo na mtoa huduma wake anayesimamia hali yake. Mpe “ <i>Taarifa kuhusu Chanjo ya COVID-19 kwa Watu walio na Hali Fulani za Kiafya</i> ”.
	➤ HAPANA	Nenda kwa Swali #8
8.	Je, hivi sasa una ujauzito?	
	➤ NDIYO	Mtu anaweza kuratibu kupewa chanjo, lakini pendekeza mtu huyo ajadili kwanza kuhusu ujauzito, na hatari na faida za chanjo na mtoa huduma wake. Mpe “ <i>Taarifa kuhusu Chanjo ya COVID-19 kwa Watu walio na Hali Fulani za Kiafya</i> ”.
	➤ HAPANA	Mwisho

* Athari kali za kutishia maisha ni pamoja na dalili za anaphylaxis kama vile uvimbe wa uso wako, midomo/ulimi, au koo; kukorota au kupumua kwa ugumu; kupoteza ghafla shinikizo la damu, nk. na unahitaji kupewa epinephrine.

** Hali za kinga ya mwili kuathirika sana ni pamoja na kuwa kwenye kemotherapi ya saratani, kuwa ndani ya mwaka mmoja baada ya kupokea upandikizaji wa kiini cha hematopoietic au kiungo, maambukizo ya VVU ambayo hayajati biwa na hesabu ya CD4 ya lymphocyte ya chini ya 200, shida ya msingi ya upungufu wa kinga mwilini, kiwango cha juu cha steroidi (k.m., kupokea zaidi ya 20 mg ya prednisone kwa siku kwa zaidi ya siku 14), nk.